

## TARJETA INFORMATIVA PARA LOS PACIENTES

### INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE - LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA

**Tibsovo® 250 mg comprimidos recubiertos.**

#### **Ivosidenib**

**Información para el paciente en tratamiento para leucemia mieloide aguda.**

**Esta tarjeta para el paciente contiene información importante para usted y para los profesionales de la salud sobre Tibsovo®**

Lleve esta tarjeta siempre con usted.

Informe a cualquier médico, farmacéutico o enfermero de que está tomando Tibsovo®.

Si presenta alguno de los síntomas que se enumeran debajo, busque atención médica urgente y muestre esta tarjeta.

#### **Acerca de su tratamiento**

- Tibsovo® se utiliza para tratar a adultos con leucemia mieloide aguda (LMA) y se administra en combinación con otro medicamento contra el cáncer llamado 'azacitidina'. Tibsovo sólo se utiliza en pacientes cuya Leucemia Mieloide Aguda (LMA) está relacionada con un cambio (mutación) en la proteína IDH1.
- Tibsovo® puede causar **efectos adversos graves**, incluido un trastorno conocido como **síndrome de diferenciación**.
- El síndrome de diferenciación puede ser potencialmente mortal si no se trata.
- El síndrome de diferenciación en pacientes con LMA puede aparecer varias semanas luego de iniciar tratamiento con TIBSOVO. En algunos pacientes, se presentó hasta 46 días después del inicio.

**Busque atención médica urgente** si presenta alguno de los siguientes **síntomas** del síndrome de diferenciación

- fiebre
- tos
- dificultad para respirar
- erupción cutánea (sarpullido)
- disminución de la cantidad de orina
- mareo o vahído
- aumento rápido de peso
- hinchazón de brazos o piernas

**En el Prospecto de Tibsovo® (Ivosidenib)**, encontrará más información detallada.

*En caso que lo desee, le agradeceremos nos comunique cualquier posible reacción adversa asociada al uso de un producto de Servier Argentina. Por favor ingrese a [www.servier.com.ar](http://www.servier.com.ar) o comuníquese al 0-800-777-SERVIER (7378).* Toda la información brindada, será recibida y gestionada por el equipo local de farmacovigilancia,, con el único propósito de monitorear el perfil de seguridad de los productos en beneficio de los pacientes.